Getreideherbizide Herbst 2011 & Frühjahr 2012

Produkt	MoA[1]	Formulierung	Giftklasse	Wirkstoffe	Kultur [2]	Stadium	Anwenden pro Jahr [3]	Dosis	Ehrenpreis (efeublättriger)	Ehrenpreis (persischer)	Kamille (Echte)	Klatschmohn	Klette	Senf / Raps	Stiefmütterchen	Taubnessel (rote)	Vogelmiere	Fuchsschwanz	Windhalm	Flughafer	Raygras	Rispe	Trespe (Taube)	Knöterich (Floh-)	Knöterich (Vogel-)	Knöterich (Winden-)	Saatwucherblume	Erdrauch	Frauenmantel	Gänsedistel	Gänsefuss (Weisser)	Greiskraut	Hellerkraut (Acker-)	Hirtentäschel	Hohlzahn	Hundspetersilie	Storchschnabel	Vergissmeinnicht	Ampfer	Distel	Quecken	Winde (Acker-)	Bodenwirkung	Blattwirkung	Abstandsauflagen*
französischer Name auf der Gebrauchsanweisung (siehe Verpackung):									véronique feuille de lierre	véronique persicaire	matricaire camomille	coquelicot	gaillet gratteron	sené (moutarde)	pensée	Lamier pourpre	mouron des oiseaux (champs)	vulpin des champs	Jouet du vent (Agrostis)	folle avoine	Raygras	paturin annuel	brome stérile	renouée persicaire	renouée des oiseaux	renouée faux-liseron	chrysantheme des moissons	Fumeterre	Alchemille	Laiteron rude	chénopode	Senecon	Tabouret des champs	Capselle (Bourse à pasteur)	Ortie royale	Aethusa	Géranium	Myosotis	Rumex	Chardon	chiendent	Liseron des champs			
Vorwiegend im Herbst angewandte Pflanzenschutzmittel									Leitverunkrautung - HERBST -									Ungräser						verschiedene Unkräuter															mehrjährige						
Arelon L	C2	SC	B	500 g/l Isoproturon	SW, SG WW WG WG Roggen Trit., Di	ab EC 11 VA & ab Bestockung VA ab Bestockung ab Bestockung VA & ab Bestockung	1 x	2 l/ha 3 l/ha 2 l/ha 3 l/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha	-	-	+	(+)	-	-	-	-	++	+(+)	++(+)	- (+)	(+)	++	-	?	-	-	-	-	++	-	++(+)	-	?	(+)	-	?	-	-	-	-	-	-	x	(x)	20m
AZ 500	L	SC	B	500 g/l Isoxaben	WW, Di, Trit., WG	VA - Keimblätter der Unkräuter	-	0,15-0,2 l/ha	++	++	++	++	-	++	++	++	++	-	-	-	-	-	-	?	+	+	++(+)	++	++	++	+++	+	?	++	+++	?	+	++	++	-	-	++	x	-	
Bacara	F1 F1	SC	C	100 g/l Diflufenican 250 g/l Flurtamone	Roggen, Trit., WW, Di., WG	ab VA	1 x	1 l/ha	+++	+++	++	++(+)	+(+)	+++	+++	++	+++	-	++	-	-	++	-	?	+(+)	+(+)	?	+++	++	-	++(+)	-	?	+++	+	?	+	+++	-	-	-	-	x	(x)	5m
							Ab der Bestockung darf Isoproturon zugemischt werden (bei WW & Di 750 gr/ha, das entspricht 1,5 ltr Arelon L und bei WG 1000 gr/ha, das entspricht 2 ltr Arelon L).																																							
Celtic	K1 F1	SC	C	320 g/l Pendimethalin 16 g/l Picolinafen	WW,WG,Trit.,Roggen, Di	ab EC 12 & ab Bestockung	1 x	2,5 l/ha	+++	+++	++	+(+)	++(+)	+(+)	+++	+++	+++	++	++(+)	-	-	++	-	?	+(+)	+(+)	+	+(+)	+(+)	++	++	-	?	++	+++	?	+(+)	++	-	-	-	-	x	(x)	5m
					Im Frühjahr darf kein Celtic mehr in WG angewandt werden.																																								
Defi	N	EC	B	800 g/l Prosulfocarb	WW, Di, WG, Roggen, Trit. SG	ab VA im NA	1 x	4-5 l/ha	+++	+++	+	-	++	+	(+)	+++	++	+	++(+)	-	-	+	-	?	-	-	-	(+)	++	-	++	(+)	?	++	++	?	(+)	(+)	-	-	-	-	x	(x)	
Toucan	F1	SC	C	500 g/l Diflufenican	WW,Di,WG,Trit.,Roggen SG	ab VA ab 5 Triebe	1 x	0,375 l/ha 0,125 l/ha	+++	+++	+	+++	++	++	++	+++	+	-	-	-	-	-	-	?	?	+	++	+	+(+)	-	++	?	++	+	+++	+	?	+(+)	-	-	-	?	x	-	20m
Herold	K3 F1	SC	B	400 g/l Flufenacet 200 g/l Diflufenican	WW, WG, Trit., WR, Di	im Herbst; im Di darf Herold & Liberator ab Erscheinen des 1. Blattes angewandt werden	1 x	0,6 l/ha	+++	+++	+(+)	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	-	+	++	-	+(+)	(+)	+(+)	+++	+(+)	++	-	+++	?	++	+	+++	++	+	++	-	-	-	-	x	(x)	5m
Liberator	K3 F1	SC	B	400 g/l Flufenacet 100 g/l Diflufenican	WW, WG, Di				+++	+++	+(+)	+++	++	++	++	++	+++	++	+++	-	+	++	-	+(+)	(+)	+(+)	+++	+(+)	++	-	+++	?	++	+	++	++	+	+(+)	-	-	-	-			20m
Linuris 500 SC	C2	SC	A	500 g/l Linuron	WR, SG, H SW	EC 01 - 08 (strikter VA)	1 x	0,8 l/ha 0,8 - 1 l/ha	++	++	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	++	+++	-	++	+(+)	++	?	+++	?	+++	+++	?	+++	+++	++	-	?	+++	-	-	-	-	x	-	5m
Javelin	C2 F1	SC	B	500 g/l Isoproturon 62,5 g/l Diflufenican	WW, Trit., WR WG	im Herbst ab Bestockung	1 x	3 l/ha	+++	+++	++	+++	++	++	++	+++	++	+(+)	+++	(+)	+(+)	++	-	?	?	+	++	+	?	-	++	?	++	+	+++	+	?	+(+)	-	-	-	?	x	(x)	20m
Malibu	K3 K1	EC	B	63,2 g/l Flufenacet 300 g/l Pendimethalin	Trit., WR WW, WG	im Herbst ab 1. Blatt	1 x	4 l/ha	+(+)	+(+)	+(+)	++	+(+)	+(+)	++	+(+)	+++	++	++	+	+	+(+)	-	++(+)	+(+)	+(+)	+	+(+)	+(+)	++	+++	?	++(+)	++	+++	++	+(+)	++	-	-	-	-	x	(x)	20m
Stomp 400 SC	K1	SC	C	400 g/l Pendimethalin	WW, WG, WR, Trit.	ab dem VA im Herbst	1 x	2 l/ha	+++	+++	+(+)	+(+)	+(+)	(+)	++(+)	+++	++(+)	++	++	-	-	+(+)	-	?	+	+	+	+	+	++	++	-	?	++	++	?	+	+(+)	-	-	-	-	x	(x)	5m
Vorwiegend im Frühjahr angewandte Pflanzenschutzmittel **Bei einer Anwendung im Herbst, zur Verstärkung einer Tankmischung, ist das Zulassungsstadium und die evtl. andere Aufwandtmenge zu berücksichtigen.**																																													
Alister	F1 B B	OD	B	150 g/l Diflufenican 9 g/l Mesosulfuron 3 g/l Iodosulfuron	WW, Di, Trit. WR	ab Bestockung ab 1. Blatt (im Herbst) ab 3. Blatt (im Frühjahr)	1 x	1 l/ha 0,6 l/ha 0,5 l/ha	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++	++	+(+)	+	?	+(+)	+(+)	++	++(+)	++(+)	?	+(+)	?	?	++(+)	++	?	+(+)	++(+)	-	-	?	?	x	x	20m
Axial	A -	EC	B	50 g/l Pinoxaden 12,5 g/l Cloquintocet	WW, Di, Gerste, Trit.	ab 3. Blatt	1 x	im Herbst 0,9 l/ha im Frühjahr 1,2 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++(+)	+++	+++	+(+)	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
Attribut	B	WG	C	70% Propoxycarbazon	WW, Trit., WR	ab Bestockung	1 x	60 g/ha	-	-	-	-	(+)	+++	-	-	-	+++	++(+)	+(+)	+(+)	+(+)	++(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	++(+)	++	-		-	-	-	-	++	-	x	(x)	
Azur	F1 C3 C2	SC	B	20 g/l Diflufenican 100 g/l Ioxynil 400 g/l Isoproturon	WW, Trit., Roggen, Di, WG SW, SG	ab Bestockung ab 3. Blatt	1 x	3 l/ha 2,5 l/ha	++	++	+++	++(+)	+	++	++	++	+++	+(+)	+++	(+)	(+)	++	-	+(+)	+(+)	+(+)	(-)	?	?	?	+++	?	?	?	++	+	?	?	?	?	-	?	x	x	20m
Cameo SX	B	SX	B	50% Tribenuron	WW, Di, WG, Trit., WR SW, SG, Hafer	ab 2. Blatt ab Bestockung	-	45 g/ha	-	-	+++	+++	-	+++	++	++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	+(+)	++	+(+)	++	++	+(+)	++	?	++	+++	?	++	++	++(+)	+++	-	-	(x)	x	5m
Djinn	A C2 -	SE	B	16 g/l Fenoxaprop 300 g/l Isoproturon 32 g/l Mefenpyr	Gerste	während der Bestockung im Herbst im Frühjahr	1 x	2 ltr/ha 2,5 ltr/ha	-	-	+(+)	-	-	-	-	-	+(+)	++(+)	++(+)	++(+)	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	20m
Isomexx	B	WG	C	20% Metsulfuron	WW, Trit., Di, WG, Roggen SW, SG, Hafer	ab 2. Blatt ab Bestockung	1 x	30 g/ha	(+)	(+)	+++	+++	+	+++	+++	++(+)	+++	-	+(+)	-	-	-	-	?	+	+	++	-	+(+)	+(+)	(+)	++(+)	?	++	+++	?	++	+(+)	+++	+++	-	-	x	x	5m
Lexus XPE	B B	WG	C	33,3% Flupyrsulfuron 6,7% Metsulfuron	WW, Trit., Di, Hafer WR	ab Bestockung ab 1. Blatt	1 x	30 g/ha 25 gr/ha	+(+)	++	+++	+++	+	+++	++(+)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	-	+	+	-	++	++	++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	?	++	++	++	+++	-	-	x	x	5m
Monitor	B	WG		80% Sulfosulfuron	WW, Trit., Di	ab 3. Blatt gegen Unkräuter	-	12,5 gr/ha	(-)	(-)	++	+	++	+++	+	(-)	++	(+)	+++	-	-	++	++(+)	+	+	+	+(+)	-	+(+)	?	-	-	?	++	+(+)	?	+(+)	++	-	-	+(+)	-	(x)	x	5m
(wird zusammen mit einem Netzmittel, z.B. Moniplus zu 0,2% angew.)						ab 1. Knoten gegen Quecken & Windhalm	2 x	25 gr/ha	Die zweite Anwendung darf frühestens 4 Wochen nach der Ersten wiederholt werden.																																				
Primus	B	SC	C	50 g/l Florasulam	Getreide	ab dem 4. Blatt	1 x	100 ml/ha	+	+	+++	+++	+++	+++	++	+	+++	-	-	-	-	-	-	+(+)	+(+)	+(+)	(+)	-	+	?	(+)	++	?	++	++(+)	?	+	++	-	-	-	-	-	x	
								50 ml/ha in einer Tankmischung gegen zweikeimblättrige Unkräuter. 25 ml/ha in einer Mischung mit AHL, ausgenommen in einer Tankmischung gegen Kletten (50 ml/ha).																																						
Puma S EW	A -	EW		69 g/l Fenoxaprop 18,75 g/l Mefenpyr	WW, SW, Roggen, Trit.	ab 3. Blatt ab 3. Blatt ab Bestockung	-	1,2 ltr/ha 0,8 ltr/ha 0,6 ltr/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
								1,2 ltr/ha in einer Tankmischung mit Fluroxypyr (z.B. Starane) und/oder einem Sulfonylharnstoff (z.B. Gratil od. Cameo SX) 0,8 ltr/ha in einer Tankmischung mit maximal 3 ltr/ha Mineralöl (und/oder z.B. Top Oil) 0,6 ltr/ha in einer Tankmischung mit maximal 750 gr/ha Isoproturon und/oder Diflufenican.																																						

Quelle: ASTA am 27. Oktober 2011

Produkt	MoA[1]	Formulierung	Giftklasse	Wirkstoffe	Kultur [2]	Stadium	Anwenden pro Jahr [3]	Dosis	Ehrenpreis (efeublättriger)	Ehrenpreis (persischer)	Kamille (Echte)	Klatschmohn	Klette	Senf / Raps	Stiefmütterchen	Taubnessel (rote)	Vogelmiere	Fuchsschwanz	Windhalm	Flughafer	Raygras	Rispe	Trespe (Taube)	Knöterich (Floh-)	Knöterich (Vogel-)	Knöterich (Winden-)	Saatwucherblume	Erdrauch	Frauenmantel	Gänsedistel	Gänsefuss (Weisser)	Greiskraut	Hellerkraut (Acker-)	Hirtentäschel	Hohlzahn	Hundspetersilie	Storchschnabel	Vergissmeinnicht	Ampfer	Distel	Quecken	Winde (Acker-)	Bodenwirkung	Blattwirkung	Abstandsauflagen*
Ausschliesslich im Frühjahr anwendtbare Pflanzenschutzmittel																																														
Allié Express	E B	WG	B	400 g/kg Carfentrazon 100 g/kg Metsulfuron	Weizen, Gerste, Trit., Di., Hafer	ab Bestockung im Frühjahr	1 x	50 g/ha	++(+)	++(+)	+++	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	-	-	-	-	-	-	+(+)	+(+)	++(+)	++	+(+)	+++	+++	+++	+(+)	?	+++	+++	?	+++	+++	+++	+++	-	-	(x)	x	5m
Atlantis WG	B B	WG	B	0,6% Iodosulfuron 3% Mesosulfuron	Weizen, Di, Trit., Roggen	ab Bestockung	1 x	150 gr/ha (Windhalm)	-	-	+++	-	-	+++	-	+(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	(+)	?	+(+)	+(+)	+	-	+	+	+	+++	++(+)	+++	-	?	-	+++	-	-	-	-	(x)	x	5m
(wird zusammen mit einem Netzmittel angew.)				9% Mefenpyr		gegen Raygras & res. Fuchsschw.:		500 gr/ha																																					
						gegen Unkräuter & Fuchsschw.:		300 gr/ha																																							
Aurora 40 WG	E	WG	B	40% Carfentrazon	Getreide	ab Bestockung im Frühjahr	1 x	50 g/ha	++(+)	++(+)	+(+)	(+)	++(+)	++(+)	+(+)	+++	(+)	-	-	-	-	-	-	++	++	+(+)	-	-	++(+)	?	+(+)	-	?	++(+)	+++	?	(+)	(+)	-	-	-	-	-	x	5m
Basagran DP-P	O C3	SL	B	233 g/l Dichlorprop-P 333 g/l Bentazon	Weizen, Gerste, Trit., Roggen, Hafer	im NA nach dem 15. April	1 x	3,0 l/ha	+(+)	+(+)	+++	++	++	+++	(+)	+	+++	-	-	-	-	-	-	+++	+++	+++	++	+	++	+++	+++	++	++(+)	++(+)	+	++	+	-	+(+)	+++	-	+++	-	x	5m
Basagran SG	C3	WG	B	87% Bentazon	Getreide	ab Bestockung	1 x	1,1 kg/ha	-	-	+++	(+) -	(+) -	++	-	+	+++	-	-	-	-	-	-	?	-	(+) -	++	(+) -	++	+	++	++	?	?	+	++	(+) -	?	?	(+) -	-	?	-	x	
Biathlon	B	WG	B	71,4 % Tritosulfuron	Getreide	bis EC 39 (Ligula)	1 x	70 gr/ha	+++	+++	+++	+(+)	++(+)	+++	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	+++	+++	+++	+++	?	?	?	+++	?	?	?	(+++)	?	?	?	?	?	-	?	-	x	
Bifenix N	E C2	SC	B	166 g/l Bifenox 333 g/l Isoproturon	WW, WG, Trit., Roggen	Mitte bis Ende Bestockung	1 x	4,5 l/ha	+++	+++	+++	+	++	-	+++	+++	++	+(+)	++(+)	(+)	(+)	++(+)	-	-	-	-	+	+(+)	++	+(+)	++	(+)	?	++	+++	?	+(+)	+(+)	-	-	-	-	x	x	5m
Bingo	E	EC	B	200 g/l Cinidon-ethyl	WW, WG, Trit., Roggen, SW, SG, Hafer	ab Bestockung	1 x	0,25 l/ha	+++	+++	-	+	++	++	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	-	?	-	?	?	-	+++	?	-	?	-	-	-	-	-	x	5m
Bofix	O O O	EW	B	20 g/l Clopyralid 200 g/l MCPA 40 g/l Fluroxypyr	Getreide	ab Ende Bestockung	1 x	4 l/ha	(-)	(-)	++(+)	+	++(+)	+++	-	(+)	++(+)	-	-	-	-	-	-	+	+	++	+	++(+)	-	+++	++(+)	+++	?	+++	++	?	+(+)	+++	++	+++	-	++	-	x	5m
Capri	B	WG	C	7,5% Pyroxsulam 7,5% Cloquintocet mexyl	WW, WR, Trit., Di	ab Bestockung	1 x	250 g / ha	+	++	+(+)	(+)	+	++	+	(+)	++(+)	++(+)	+++	+++	++(+)	++	+(+)	?	+(+)	?	-	(+)	?	?	-	?	?	++(+)	-	++(+)	++(+)	++(+)	?	-	-	?	-	x	
Capri Twin	B B	WG	C	2,3 % Florasulam 6,8% Pyroxsulam	WW, WR, Trit., Di	ab Bestockung	1 x	220 g / ha	++	++	+++	+++	+++	+++	+(+)	+	++(+)	++(+)	+++	+++	++(+)	++	+(+)	+(+)	+(+)	+(+)	++(+)	(+)	?	?	?	(+)	?	?	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	?	-	-	?	-	x	5m
(wird zusammen mit einem Netzmittel angew.)				6,8% Cloquintocet mexyl																																									
Cossack (wird zusammen mit einem Netzmittel angew.)	B B	WG	B	9% Mesosulfuron 3% Iodosulfuron	WW,SW,Di,Trit,Roggen	ab Bestockung	1 x	0,3 kg/ha	-	-	+++	+(+)	(+)	+++	(+)	(+)	+++	+++	+++	++	+++	++	+(+)	?	+(+)	+(+)	+	-	(+)	?	(+)	?	?	+++	-	?	-	+++	-	-	-	-	(x)	x	5m
Duplosan DP-P	O	SL	B	600 g/l Dichlorprop-P	Weizen, Di, Gerste, Hafer	Ende Bestockung	-	2,4 l/ha	+	+	+(+)	+++	++	+++	(+)	-	+(+)	-	-	-	-	-	-	++(+)	++(+)	++(+)	-	+	?	++(+)	+++	?	++(+)	++(+)	-	++	+	-	+(+)	+++	-	+++	-	x	
Duplosan KV-P	O	SL	B	600 g/l Mecoprop-P	Weizen, Di, Gerste, Hafer	Mitte bis Ende Bestockung	-	2,4 l/ha	+++	+++	-	+	+++	++	(+)	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)	?	(+)	++(+)	?	+++	++(+)	+	+	++	-	++	(+)	-	(+)	-	x	
Hedonal Optica MCPP-P	O	SL	B	600 g/l Mecoprop-P	Weizen, Di, Gerste, Hafer	Mitte bis Ende Bestockung	-	2,4 l/ha	+++	+++	-	+	+++	++	(+)	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)	?	(+)	++(+)	?	+++	++(+)	+	+	++	-	++	(+)	-	(+)	-	x	
					Roggen	ab 3. Blatt	1 x																																						
Duplosan Super	O O O	SL	B	310 g/l Dichlorprop-P 130 g/l Mecoprop-P 160 g/l MCPA	Weizen, Di, Gerste, Hafer	Mitte bis Ende Bestockung	1 x	2,5 l/ha	+	+	+	+	++(+)	+++	-	(+)	++(+)	-	-	-	-	-	-	?	++(+)	++(+)	-	+++	-	++	+++	-	?	+++	+	?	++	++	-	++(+)	-	++(+)	-	x	
Gratil	B	WG	C	75% Amidosulfuron	Weizen, Gerste, Roggen, Trit., Hafer	ab 3. Blatt (im Frühjahr)	-	40 g/ha	-	-	++	-	+++	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	+	+	-	-	(+)	-	(+)	?	?	+++	++	?	-	+++	-	-	-	-	(x)	x	
					In Mischung mit einem Herbizid mit sekundärer Wirkung auf Klettenlabkraut ist die Dosis auf 20-30 g/ha zu reduzieren.																																								
Hussar Ultra	B -	OD	B	100 g/l Iodosulfuron 300 g/l Mefenpyr	WW, Di, Trit., WR	ab Bestockung	1 x	100 ml/ha	++ (>85 ml/ha)	++ (>85 ml/ha)	+++	++	++(+)	++	+(+)	++(+)	+++	-	+++	+(+)	+++	++	-	+(+)	+(+)	+(+)	++	++	+	++	++	+++	+++	++(+)	+++	?	+	++	-	++	-	?	(x)	x	5m
					SW, SG	ab 3. Blatt		75 ml/ha																																						
Hussar Tandem	F1 - B	OD	B	10 g/l Iodosulfuron 50 g/l Mefenpyr 150 g/l Diflufenican	WW, Trit., Di	ab Bestockung	1 x	1 ltr/ha	++	+++	+++	++	+++	++	++(+)	++(+)	+++	-	+++	+(+)	+++	++(+)	-	+(+)	+(+)	+(+)	++	++	+++	++	+++	+++	(+)	+++	+++	?	+	+++	+	++	-	?	(x)	x	10m
Kart	O B	SE	B	100 g/l Fluroxypyr 1 g/l Florasulam	Weizen, Di, Gerste, Hafer	ab Bestockung	1 x	1,2 l/ha	(+)	(+)	+++	+++	+++	+++	(+)	+(+)	+++	-	-	-	-	-	-	?	+(+)	+++	-	-	+(+)	?	-	++	?	+++	++(+)	?	-	+(+)	+	-	(+)	-	x	
					Roggen, Trit.	ab 3. Blatt		1,8 l/ha																																						
Matrigon	O	SL	C	100 g/l Clopyralid	Getreide	ab Ende Bestockung	-	0,9 l/ha	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	(+)	+(+)	+(+)	-	-	++	-	+(+)	?	-	-	?	-	-	-	+++	-	-	-	x	
Milan	E E	SC	C	500 g/l Bifenox 9 g/l Pyraflufen	WW,WG	ab Bestockung	-	1,33 l/ha	+++	+++	+	+++	+	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	?	?	?	-	?	?	?	+++	?	?	?	+++	?	?	?	-	-	-	-	-	x	
Platform S	E O	WG		1,5% Carfentrazon 60% Mecoprop-P	Weizen, Di, Gerste Trit., Hafer	ab Bestockung Wartezeit: 90 Tage	1 x	1 kg/ha	+++	+++	-	+	++(+)	++	(+)	++	++	-	-	-	-	-	-	?	+(+)	++(+)	-	+(+)	++	+(+)	++(+)	(+)	?	+++	++	?	+(+)	(+)	-	(+)	-	-	-	x	5m
Starane **od. Flurostar180, Tomahawk**	O	EC	B	180 g/l Fluroxypyr	Getreide	ab Bestockung	1 x	1 l/ha	-	-	-	(+)	+++	-	-	+(+)	++(+)	-	-	-	-	-	-	+(+)	+(+)	+++	-	+(+)	(+)	-	-	+	-	-	++	-	-	++(+)	++	-	-	++	-	x	10m
Tandus 200	O	EC	B	200 g/l Fluroxypyr	WW, Gerste, Trit., Di, Roggen, Hafer	ab Bestockung	1 x	0,9 ltr/ha	-	-	-	(+)	+++	-	-	+(+)	++(+)	-	-	-	-	-	-	+(+)	+(+)	+++	-	+(+)	(+)	-	-	+	-	-	++	-	-	++(+)	++	-	-	++	-	x	10m
					Bei einer Mischung mit einem registrierten Mittel gegen das Klettenlabkraut, oder einer Mischung mit einem flüssigen Stickstoffdünger gilt eine Dosierung von 0,45 l/ ha.																																								
Starane Kombi	O O C3	EC		30 g/l Clopyralid 100 g/l Fluroxypyr 120 g/l Ioxynil	Di, Trit., WW	ab Bestockung	-	1,5 ltr/ha	+(+)	+(+)	+++	+	+++	(+)	(+)	+(+)	++(+)	-	-	-	-	-	-	++	++	+++	+	+(+)	(+)	++	++	+(+)	?	?	++	?	?	?	++	+++	-	++	-	x	20m
					WG, Roggen	ab Bestockung		1,5 ltr/ha	in einer Tankmischung von maximal 720 g/ha Chlormequat (z.B. 0,9 ltr/ha CCC) zzgl. maximal 200 ltr AHL pro ha.																																						
					SW	ab Mitte Bestockung		1,5 ltr/ha	in einer Tankmischung von maximal 200 ltr AHL pro ha.																																					
					WW, WG, Trit., Di, Roggen, SW, SG, Hafer	ab Bestockung		2 ltr/ha	in einer Tankmischung mit maximal 540 g/ha Chlormequat (z.B. 0,7 ltr/ha CCC)																																					
					WW, WG, Trit., Di	ab Bestockung		1,5 ltr/ha	in einer Tankmischung mit einem Mittel das Isoproturon enthält.																																					
Topik	A - 	EC	B	100 g/l Clodinafop 25 g/l Cloquintocet	WW, Roggen, Trit.	ab 3. Blatt	1 x	0,42 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					in einer Tankmischung mit maximal 3 l/ha Mineralöl (oder z.B. Top Oil)																																										
					WW, Roggen, Trit.	ab 3. Blatt		0,48 l/ha	in einer Tankmischung mit einem anderen Herbizid.																																					
					WW, Roggen, Trit.	ab 3. Blatt		0,6 l/ha	ohne Mischungspartner.																																					
					WW	im Herbst		0,3 l/ha	in einer Tankmischung mit maximal 1 l/ha Mineralöl (oder z.B. Top Oil)																																					
					SW	im NA		0,5 l/ha																																					
U 46 Combi	O 4 O 4	SL	B	315 g/l MCPA 360 g/l 2,4 D	Weizen, Gerste, Trit., Di., Roggen, Hafer	ab Ende Bestockung	1 x	1,5 ltr/ha	-	-	-	(+)	-	+++	-	+	-	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	-	+(+)	+++	-	+++	+	+	+	+(+)	+	(+)	++(+)	-	++(+)	-	x	
U 46 M 75	O 4	SL	B	750 g/l MCPA	Weizen, Gerste, Roggen, Di., Trit., Hafer	ab Ende Bestockung	1 x	2 ltr/ha	-	-	-	+	-	+++	-	+	-	-	-	-	-	-	-	(+)	-	-	-	(+)	?	+++	+++	?	+++	+++	+(+)	-	+++	+(+)	+(+)	++(+)	-	++(+)	-	x	5m
Verigal D	E O	SC	B	250 g/l Bifenox 308 g/l Mecoprop-P	WW, SW, Di, WG, SG, Hafer	ab Bestockung	-	2,5 l/ha	+++	+++	-	+	++	++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	?	++(+)	++(+)	-	+++	+(+)	+++	+++	+	?	+++	++	-	+	+++	-	(+)	-	-	-	x	10m

Quelle: ASTA am 27. Oktober 2011

++: sehr gute Wirkung, ++: gute Wirkung, +: Teilwirkung, -: keine Wirkung, (): mit Einschränkung, ?: keine Information vorhanden.

VSE: VorSaatEinarbeitung / VA: VorAuflauf / NA: NachAuflauf

*: Der Wert (in Meter) gibt an, welcher Mindestabstand zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer eingehalten werden muss. Angaben sind ohne Gewähr. Bitte lesen Sie die Anwendungshinweise auf dem Etikett.

1) MoA: Mode of Action (Wirkmechanismus) nach HRAC (Herbicide Resistance Action Committee)

2) Die Zulassung der Produkte in den jeweiligen Kulturen werden 1 - 2 x jährlich überprüft. **Ausschlaggebend und bindend sind bei der Anwendung ausschliesslich die Veröffentlichungen der A.S.T.A.**

3) Maximale Zahl der Anwendungen dieses Produktes oder eines Produktes mit dem gleichen Wirkstoff.