

französischer Name  
auf der Gebrauchs-  
anweisung (siehe  
Verpackung):

Rumex
Chardon
Grande Ortie
Pissenlit
Mouon des oiseaux
Renoncule
Anthriscus
Berce
Achillée
Jonc
Tabouret
Capselle (Bourse à pasteur)
Tussilage
Prêle
Plantain

Grünlandherbizide 2011

Produkt	Formulierung	Wirkstoff	g/l	Dosis	Ampfer	Distel	Brennnessel	Löwenzahn	Vogelmiere	Hahnenfuss	Wiesenkerbel	Bärenklau	Schafgarbe	Binsen	Hellerkraut	Hirtentäschel	Hufblatich	Schachtelhalm	Wegerich	Gräserverträglichkeit	Kleeverträglichkeit	Wartezeit (Gras/Heu)	Anwendungseignung						Bemerkung	Anwendung A.S.T.A. <sup>3)</sup>		
																							Frühjahr	Sommer	Herbst	kühle Witterung (ab 10°C)	warme Witterung (bis 25°C)	Abstandsaufgaben				
Asulox		Asulam	400	4 l/ha	xx(x)				x											+(+)	+(+)	7	xx(x)	x(x)	xxx	xx	xxx			Frühjahr		
AZ 500	SC	Isoxaben	500	0,1 l/ha	-	-	xx	-	xxx	xx	x		xx								++	-									gleich nach der Saat	
Basagran DP-P (2)	SL	Bentazon	333	3 l/ha	x	xx	xx	x(x)	xxx	x	x	xx	-	-	xxx	xxx	xx	-	xx	++	-			xx	x	(x)	x	xxx	5 m	bei hoher Einstrahlung	Grassamen	
		Dichlorprop-P	233																													
Basagran SG	WG	Bentazon	87%	1,5 kg/ha	-	x	x	-	xxx	-	?	-	?	?	xxx	xxx	-	-	?	++	?	7	x	xxx	(x)	x(x)	xx		bei hoher Einstrahlung	Frühjahr		
Bofix/Dinet	EW	MCPA	200	4-6 l/ha	xx(x)	xxx	x(x)	xx(x)	xx(x)	x(x)	(x)	(x)	(x)	xx(x)	xx(x)	xx(x)	-	x(x)	xx(x)	++	-	7	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	5 m			Frühjahr	
		Fluroxypyr Clopyralid	40 20																													
Bofort		Fluroxypyr Aminopyralid	100 30	2 l/ha	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xxx	x		xxx	xxx	x	xxx	++	-	7	xxx	xx	xxx	xxx	xxx		Mai - Juli			
Butizyl Tropotox 400 SL		MCPB	400	5 l/ha	x	xx(x)	-	x(x)	-	xx(x)										++	++	7	x	xx	x	x	xxx		auf Grasland nur Butizyl anwenden	2 - 6 Blattstadium		
Duplosan KV	SL	MCPP (Mecoprop-P)	600	50 ml/10 ltr	xx	x	xx	x	xxx	x	(x)	-	-	-	xxx	xxx	xxx	-	xx	++	-	28	1)	1)	1)	xx	xxx		Einzelpflanzenbehandlung	lokale Anwendung		
Ethomat 500 (Gräsermittel)		Ethofumesat	500	2-2,4 l/ha *) max. 1,5 l/ha					xxx											+(+)									spätestens 2 Wochen vor der Mahd od. Beweidung / Saatgutbau*			
Gardon Tribel forte Tribel 100 EC TRI-BUT Mutan		Triclopyr	480	40 ml/10 ltr	x(x)	-	xxx	xxx	xxx	xx(x)	-	xxx	-	xxx	xxx	xxx	-	-	xx(x)	++	-	14	1)	1)	1)	xx	xxx	10 m	Einzelpflanzenbehandlung	lokale Anwendung		
			480	40 ml/10 ltr																												
			100	20 ml / ltr																												
			100	20 ml / ltr																												
100	20 ml / ltr																															
Gratil	WG	Amidosulfuron	75%	60 g/ha	xx(x)	x	x	xx	xx	x(x)	x	x	x							+(+)	+(+)	21	xx	-	xxx	xxx	xx		August/September	Herbst		
Harmony Pasture SX		Thifensulfuron	50%	30 g/ha	xxx	x	x(x)	x	xx	x	-	x	xx(x)	-	-	xx(x)	-	-	-	+	+	28	xx	x(x)	xxx	xxx	xx	5 m	Herbst	nach dem letzten Schnitt		
Isomexx	WG	Metsulfuron	20%	30 g/ha	xxx	xxx	xx	?	xx(x)	?	?	?	x(x)	-	?	xx	?	?	?	(+)	-	14	-	-	xxx	xxx	5 m	frühestens 6 Monate nach der Saat				
Primus	SC	Florasulam	50 g/l	0,05-0,1 l/ha	-	(x)	?	?	xxx	xx(x)	?	?	?	?	?	xx(x)	?	?	?	++	-				xxx			auch in Grassamenvermehrung	Frühjahr			
Starane Tomahawk Fluorstar	EC	Fluroxypyr	180	2 l/ha	xxx	-	xx	xx(x)	xxx	x	x	x	x	-	xxx	x(x)	-	x	x	++	-	7	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	10 m	März - April			
			200	1,8 l / ha	xxx	-	xx	xx(x)	xxx	x	x	x	x	-	xxx	x(x)	-	x	x	++	-	7	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	10 m	März - April			
Starane Kombi	EC	Fluroxypyr Ioxynil Clopyralid	100 120 30	2-3 l/ha	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xx(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	?	?	?	?	?	?	++	-	8	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	20 m	Mai - Juni			
U46 M75	SL	MCPA	750	1,3-2,7 l/ha**	x	xx(x)	-	xxx	-	xx(x)	-	-	-	xxx	xx	xxx	-	xx	xxx	++	(+)	7	xxx	xxx	-	xx	xxx		** bei Grassamen max. 2 l/ha anwenden			
U46 Combi	SL	MCPA 2,4 D	315 360	1,75 - 2,25 l/ha	x	xx(x)	-	xxx	-	xx(x)	-	-	-	xxx	xx	xxx	-	xx	xxx	++	-	7	xxx	xxx	-	xx	xxx					

(1): nur Einzelpflanzenbehandlung erlaubt

(2): nur auf Futtergras erlaubt

(3): Die Zulassung der Produkte in den jeweiligen Kulturen werden 1 - 2 x jährlich überprüft. **Ausschlaggebend und bindend sind bei der Anwendung ausschliesslich die Veröffentlichungen der A.S.T.A.**