

Rapsherbizide 2011						französischer Name auf der Gebrauchsanweisung (siehe Verpackung):																															
Produkt	MoA1)	Formulierung	Wirkstoffe	Stadium	Dosis	Fuchsschwanz	Windhalm	Rispe	Quecke	Trespen	Ausfallgetreide	Ehrenpreis	Erkraut	Hellerkraut	Hirtentäschel	Hundspetersilie	Kamille	Klatschmohn	Klette	Knöterich	Kompasslattich	Nachtschatten	Ochsenzunge & Ackerkrumhals	Phacelia (Ausfall-)	Rauke Arten	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vergissmeinnicht	Vogelmiere	Melde - Arten	Bodenwirkung	Blattwirkung	Abstandsauflagen*			
<b>Herbizide zur Vorsaateinbearbeitung (VSE) und für den Voraufbau (VA):</b>																																					
Devrinol 45 FL	K3	SC	450 g/l Napropamid	VSE	2,0-2,5 l/ha	++	++(+)	++	-	-	+	++(+)	?	++(+)	(+)	?	+++	-	+	?	++	?	++(+)	?	-	(+)	?	(+)	?	+++	+++	x	-				
Centium 36 CS	F3	CS	360 g/l Clomazone	VA	0,33 l/ha	-	-	(+)	-	-	-	++(+)	-	++(+)	++(+)	++(+)	+	(+)	+++	++(+)	++(+)	++	++(+)	?	++	-	-	++(+)	(+)	+++	+	x	-				
<b>Metazachlor haltige Produkte (Es darf, innerhalb 3 Jahren, maximal 1 kg Metazachlor pro ha angewandt werden):</b>																																					
Springbok	K3 K3	EC	200 g/l Dimethenamid-P 200 g/l Metazachlor	VA & NA1 - NA2	3 l/ha	++(+)	++	++	-	-	(+)	++(+)	?	++ (2)	+(2)	?	+++	++	++(+)	++(+)	?	+	-	?	+(2)	++	++ (2)	+++	++	+++	+	xx	(x)	5m			
Butisan Plus	K3 O	SC	400 g/l Metazachlor 100 g/l Quinmerac	VA-NA2	0,8 - 2,5 ltr/ha	++(+)	+++	+++	-	+	-	+++	-	++(+)	+(2)	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	-	++(+)	-	++(+)	+(2)	+	(+)	(2)	++	++(+)	++	+	x	(x)	20m		
Rapsan TDI	K3 O	SC	400 g/l Metazachlor 100 g/l Quinmerac	VA-NA2	0,8 - 2,5 ltr/ha	++(+)	+++	+++	-	+	-	+++	-	++(+)	+(2)	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	-	++(+)	-	++(+)	+(2)	+	(+)	(2)	++	++(+)	++	+	x	(x)	20m		
Butisan S	K3	SC	500 g/l Metazachlor	VA-NA2	2 ltr/ha	++(+)	+++	+++	-	+	-	+++	?	++(+)	+(2)	?	+++	++(+)	++(+)	++(+)	-	?	?	?	+(2)	+	(+)	(2)	++	++(+)	++	+	x	(x)	20m		
Fuego	K3	SC	500 g/l Metazachlor	VA-NA2	2 ltr/ha	++(+)	+++	+++	-	+	-	+++	?	++(+)	+(2)	?	+++	++(+)	++(+)	++(+)	-	?	?	?	+(2)	+	(+)	(2)	++	++(+)	++	+	x	-	20m		
Rapsan 500 SC	K3	SC	500 g/l Metazachlor	VA-NA2	2 ltr/ha	++(+)	+++	+++	-	+	-	+++	?	++(+)	+(2)	?	+++	++(+)	++(+)	++(+)	-	?	?	?	+(2)	+	(+)	(2)	++	++(+)	++	+	x	-	20m		
<b>NA-Herbizide:</b>																																					
Effigo	O O	SL	267 g/l Clopyralid 67 g/l Picloram	NA	0,35 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	?	+	+	+	+++	(+)	++	++(+)	++	?	(+)	?	?	(+)	-	-	?	(+)	?	-	x				
Matrignon	O	SL	100 g/l Clopyralid	ab NA2	1,5 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	?	-	-	++(+)	+++	-	-	(+)	++	?	-	?	?	-	?	-	-	-	-	-	-	-	x		
<b>Gräsermittel:</b>																																					
Agil	A	EC	100 g/l Propaquizafop	NA	0,75-1,5 l/ha	++(+)	+++	+	++(+)	++(+)	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	5m	
Focus Plus	A	EC	100 g/l Cycloxydim	NA	2,0 l/ha	+++	+++	+	++	++(+)	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		
Fusilade Max	A	EC	125 g/l Fluazifop-P-butyl	NA	1,0-3,0 l/ha	+++	+++	+	++(+)	++(+)	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
Kerb 400 SC	K1	SC	400 g/l Propyzamide	ab NA4/5	1,875 l/ha	+++	+++	+++	(+)	(+)	++	++(+)	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+++	-	x	-				
Targa Prestige	A1	EC	50 g/l Quizalofop-P	NA	1 - 3 l/ha	+++	+++	+	++(+)	+	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		

+++ : sehr gute Wirkung, ++ : gute Wirkung, + : Teilwirkung, - : keine Wirkung, () : mit Einschränkung, ? : keine Information vorhanden

VSE = Vorsaateinbearbeitung, VA = Voraufbau, NA1 = Nachaufbau 1. Rapsblatt, NA2 = Nachaufbau 2. Rapsblatt, etc.

\*: Der Wert (in Meter) gibt an, welcher Mindestabstand zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer eingehalten werden muss. Angaben sind ohne Gewähr. Bitte lesen Sie die Anwendungshinweise auf dem Etikett.

1) MoA: Mode of Action (Wirkmechanismus) nach HRAC (Herbicide Resistance Action Committee)

(2): Wirkung bei Anwendung spätestens 4 Tage nach der Saat.

(3): keine bessere Wirkung im Pack mit Springbok.

(4): bessere Wirkung im Pack mit Springbok