

Schädlinge im Raps

27. – 31. August 2009

Im Minette und an der Mosel laufen die Rapsbestände bereits auf, ebenso in einzelnen Regionen des Gutlandes. Bisher konnten noch keine Rapserrflöhe in den Gelbschalen gefunden werden. Nach Beobachtungen der letzten beiden Jahre ist 2009 mit stärkerem Auftreten des Rapserrfloh zu rechnen.

Vereinzelt fanden sich Kohlfliegen in den Gelbschalen. Die Kleine Kohlfliege legt ihre Eier in den Boden in unmittelbarer Nähe der jungen Rapswurzel. Die Larven sind typische Fliegenmaden (beinlos) und suchen die Wurzel aktiv auf, um dort zu fressen. Gegen die Kohlfliege sind keine Insektizide zur Applikation zugelassen. Eine geeignete Beize (z.B. Premium-Beize) kann den Befall zwar reduzieren, aber nicht vollständig verhindern. Gefährdet sind in erster Linie Fröhsaaten von Mitte/Ende August. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Bestände von Alt-Raps am Feldrand entfernen, da sie eine Brutstätte für die Larven der Kohlfliege sind.

In Burmerange fanden sich in der Gelbschale einige Kohlmotten. Die Kohlmotte ist ein so genannter Kleinschmetterling, gräulich gesprenkelt, etwa 1,5 cm groß und ähneln von der Körperform stark den bekannten Vorratsmotten. Die Larven (Raupen) sind gelblich-grün und verursachen Lochfraß an den Blättern. Bei Erschütterung seilen sie sich mit einem Seidenfaden vom Blatt ab. Die Kohlmotte tritt immer mal wieder im Rapsbestand auf, besonders in wärmeren Klimaten. Sie kann vereinzelt in jungen Rapsbeständen starken Schaden anrichten. Momentan ist sie aber kein Problem.

Tabelle 1: Übersicht über die Versuchsstandorte am 31. August 2009.

Standort Sorte Saattermin	Differdange Exquisite (H) 19. August 09	Burmerange Dimension (H) 19. August 09	Everlange Billy (L) 28. August 09
Rapserrflöhe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert 75 Käfer pro Gelbschale im Zeitraum 01. - 20. September oder 10% der Blattfläche durch Frass zerstört	0	0	0
Kleine Kohlfliege Kein Bekämpfungsrichtwert bekannt	Vereinzelter Zuflug	Vereinzelter Zuflug	Kein Zuflug
Entwicklungsstadium (BBCH)	BBCH 09	BBCH 09	---

BBCH 09 = Keimblätter durchbrechen Boden.