

Schädlinge im Raps

14. – 17. September 2009

Es fanden sich kaum Rapserrflöhe und nur wenige Kohlfliegen in den Gelbschalen. Die Erfassung des Rapserrfloh geschieht mit der Gelbschale. Der Bekämpfungsrichtwert ist erreicht, wenn Sie

- 50 Rapserrflöhe pro Gelbschale innerhalb von 10 Tagen finden oder
- 10% der Blattfläche der jungen Rapspflanze durch Fraß zerstört sind.

Die Erfassung der Kohlfliege mit der Gelbschale ist schwierig, da sie nur schwer von anderen Fliegen zu unterscheiden ist. Auch gibt es keinen Bekämpfungsrichtwert. Die Kohlfliege ist ein Schädling gegen den keine Insektizidapplikation zugelassen ist; nur die Wahl einer geeigneten Beize mit Insektizidanteil als vorbeugende Maßnahme ist erlaubt.



Der Rapserrfloh (Bilder: Eickermann)

In den Beständen zeigen sich die erste Symptome verschiedener Rapskrankheiten. Am Standort Oberkorn wurde Falscher Mehltau an den Keimblättern entdeckt (deutlich erkennbar an der Vergilbung und an dem weißen Pilzrasen auf der Blattunterseite). Falscher Mehltau findet sich eher in höher gelegenen Regionen des Landes, wo die Bestände langsamer abtrocknen. Eine Fungizidbehandlung gegen Falschen Mehltau ist nicht zugelassen.

In Burmerange wurden erste Infektionen von Phoma festgestellt (Blattflecken mit ersten Pyknidien), die Krankheit ist hier noch in einem sehr frühen Stadium. Grundsätzlich ist Phoma eher ein Problem der warmen Mosellagen.

Zur Erinnerung: Wachstumsregler wie beispielsweise HORIZON EW (Tebuconazol) haben zwar einen Bekämpfungseffekt gegen Phoma, sie wirken aber nicht gegen Falschen Mehltau.

Tabelle 1: Übersicht über die Versuchsstandorte am 17. September 2009.

Standort	Differdange	Burmerange	Everlange	Christnach	Reuler
Sorte	Exquisite (H)	Dimension (H)	Billy (L)	Exocet (H)	Adriana (L)
Saattermin	19. August 09	19. August 09	28. August 09	23. August 09	29. August 09
Rapserrflöhe pro Gelbschale (seit 10. September 2009) Bekämpfungsrichtwert 50 Käfer pro Gelbschale im Zeitraum von 10 Tagen oder 10% der Blattfläche durch Fraß zerstört.	0	2	8	1	---
Kleine Kohlfliege Kein Bekämpfungsrichtwert bekannt	Einige	Viele	Viele	Einige	---
Krankheiten	Falscher Mehltau an Keimblättern	Erste Symptome von Phoma	---	---	---
Entwicklungsstadium (BBCH)	BBCH 13	BBCH 13	BBCH 11-12	BBCH 12-13	BBCH 11-12

BBCH 11 = Erstes Laubblatt entfaltet; BBCH 12 = Zweites Laubblatt entfaltet; BBCH 13 = Drittes Laubblatt entfaltet.