

Schädlinge im Raps

11. – 14. September 2026

Der Raps entwickelt sich, und die meisten Bestände zeigen drei (BBCH 13) oder sogar schon vier Blätter (BBCH 14) (**Bild 1**). Man sieht aber auch deutlich, welche Regionen mehr Niederschlag hatten als andere. Der Schädlingsdruck ist immer noch sehr gering. Wir finden kaum die „Kleinen Schädlinge“ im Bestand, wie z.B. die Rübsenblattwespe oder auch die Kohlmotte. Und auch der Rapserrdfloh findet sich in sehr geringer Anzahl in den Gelbschalen (**Tabelle 1**). Auch der Lochfraß an den jungen Pflanzen durch den Rapserrdfloh ist extrem gering (maximal bis 2 %). Das ist kaum bekämpfungsrelevant. Wir schauen bis zum Vierblatt-Stadium (BBCH 14) auf den Lochfraß am Blatt. Nach diesem Stadium sind keine Insektizide mehr zugelassen. Es könnte daher sein, dass wir diesen Herbst ohne Applikationen gegen den Rapserrdfloh auskommen. Das wäre ein großes Glück, da vermutlich aufgrund der Resistenz die meisten Regionen ohnehin nur einen geringen Bekämpfungserfolg mit Pyrethroiden (Decis, Karate, etc.) verbuchen könnten. Aber es fehlt immer noch an ausreichenden Daten. Bei der Kohlfliege ist keine chemische Bekämpfung zugelassen. Die Schäden der Larven an der Pfahlwurzel werden in einem Herbst mit ausreichenden Niederschlägen i.A. kompensiert. Schnecke sitzt stärker am Feldrand als gedacht. Da sollte man einmal genauer die Schläge inspizieren.



Bild 1: Schöner Bestand in Obercorn mit BBCH 13-14 © Eickermann

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am 14. September 2026. Angegeben ist jeweils die mittlere Anzahl des Schädlings pro Gelbschale, bzw. der mittlere prozentuale Anteil der zerstörten Blattfläche, bzw. eine Einschätzung der Zuflugstärke der Kohlfliege.

Region	Minette	Mosel	Gutland		Oesling	
Standort Sorte Saattermin	Obercorn Eros # 26/08/2026	Burmerange Hemma # 23/08/26	Everlange LG Adamant 25/08/2026	Bettendorf Ceos # 21/08/2026	Kehmen Daktari # 26/08/2026	Reuler Olivia /Amea 24/08/26
Rapserrdföhe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen (seit 07/09/2026)	3	0	2	1	9	1
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserrdfloh Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	<2%	2%	<2%	2%	2%	<2%
Zuflug Kohlfliege Bekämpfungsrichtwert unbekannt	mittel	gering	mittel	Sehr gering	mittel	gering
Pflanzenkrankheiten	Falscher Mehltau	---	---	---	---	---
Stadium Raps (in BBCH*)	13-14	13-14	12-13	13	12-13	13

LEGENDE



Bestand bereits behandelt



Bestand behandeln



Bestand kontrollieren



Keine Behandlung notwendig

* **BBCH 12** = Zweites Laubblatt entfaltet; **BBCH 13** = Drittes Laubblatt entfaltet; **BBCH 14** = Viertes Laubblatt entfaltet. # = mit Beimischung einer frühblühenden Sorte (z.B. Exavance) als Fangpflanze zur Kontrolle des Rapsgranzkäfers.

Kurzfassung

- Bestände im Drei- bzw. Vier-Blatt-Stadium (BBCH 13-14)
- Immer noch sehr geringer Schädlingsdruck durch Rapserrdfloh.
- Auch andere Schadinsekten kaum im Bestand zu finden!
- An den Feldrändern mal auf Schnecken achten!!!!