Chambre d'Agriculture
Lycée Technique Agricole
LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LIST
SENTINELLE
Université de Liège
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture

Schädlinge im Raps

26. – 31. August 2026

Bild 1: © *mit freundlicher Genehmigung von G Tempels*

Nun geht es wieder los. Schlag auf Schlag ist bereits in der Vorwoche gedrillt worden (**Bild 1**), weil es an einzelnen Tagen doch optimal war. Trotz aller guten Vorsätze für eine „Frühe Saat", um den resistenten Rapserdfloh zu managen, erfolgte witterungsbedingt die Saat wieder in der letzten August-Dekade. Auf den Feldern stehen nun die Gelbschalen (**Tabelle 1**). In Bettendorf haben wir die Schalen erst heute (01. September) aufgestellt, da gibt es erst Donnerstag Daten. Wir freuen uns aber, wieder im Bettendorfer Raps unterwegs sein zu dürfen! Mit dem ersten Zuflug der Rapserdflöhe ist zum Wochenende zu rechnen. Wir gehen derzeit aufgrund der Sommertrockenheit nicht von Starkbefall im Herbst aus.
Aber lassen wir uns überraschen. Der wenige Niederschlag bis Dienstag hat hier und da Schnecken am Feldrand aktiviert. Da sollte man mal schauen. Die Bestände laufen durch die bisherigen Niederschläge ganz gut und regelmäßig auf. Teilweise sind die Keimblätter bereits gut entwickelt (BBCH 10). Man sollte aber nun hoffen, dass es weitere Niederschläge gibt, damit das Wachstum weiter gefördert wird.

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am **31. August 2026**. Angegeben ist jeweils die mittlere Anzahl des Schädlings pro Gelbschale, bzw. der mittlere prozentuale Anteil der zerstörten Blattfläche, bzw. eine Einschätzung der Zuflugstärke der Kohlfliege.

Region	**Minette**	**Mosel**	**Gutland**		**Oesling**	
Standort Sorte Saattermin	**Oberkorn** Eros # 26/08/2026	**Burmerange** Hemma # 23/08/26	**Everlange** LG Adamant 25/08/2026	**Bettendorf** Ceos 26/08/2026	**Kehmen** Daktari # 26/08/2026	**Reuler** Olivia /Amea 24/08/26
Rapserdflöhe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen (seit 26/08/2026)	0	0	0	Noch keine Daten	0	0
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserdfloh Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuflug Kohlfliege Bekämpfungsrichtwert unbekannt	Sehr gering	gering	gering	---	gering	Sehr gering
Pflanzenkrankheiten	---	---	---	---	---	---
Stadium Raps (in BBCH*)	09-10	09-10	08	09	09	09-10

LEGENDE Bestand bereits behandelt | Bestand behandeln | Bestand kontrollieren | Keine Behandlung notwendig

* **BBCH 08** = Hypokotyl mit den Keimblättern wächst zur Bodenoberfläche; **BBCH 09** = Auflaufen; Keimblätter durchbrechen den Bodenoberfläche; **BBCH 10** = Keimblätter voll entwickelt. # = mit Beimischung einer frühblühenden Sorte (z.B. Exavance) als Fangpflanze zur Kontrolle des Rapsglanzkäfers.

Kurzfassung

- Der Raps ist an den meisten Standorten bereits gedrillt.
- Feldaufgang bisher schön gleichmäßig und im Stadium BBCH 09-10
- Erfassung der Rapsschädlinge in den Schlägen hat begonnen.
- Bisher KEIN Schädlingsdruck durch Rapserdfloh.
- An den Feldrändern mal auf Schnecken achten!!!! Da ist mehr los als gedacht…

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann
Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST)
Environmental Sensing and Modelling Unit (ENVISION)
Agro-environmental Systems Group
41, rue du Brill | L-4422 Belvaux | LUXEMBOURG
michael.eickermann@list.lu; 0049 173 377 58 18

Das Projekt „SENTINELLE" wird finanziert mit Hilfe des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau.