

Schädlinge im Raps

01.- 05. Oktober 2026

Der Raps besitzt derzeit 5 bis 6 Blätter (BBCH 15 bis 16). Einige Bestände leiden immer noch extrem unter der Trockenheit und sind daher wirklich schlecht entwickelt. Grundsätzlich spielt bei gut entwickelten Pflanzen von BBCH 15 der Blattfraß durch den Rapserrdfloh KEINE Rolle mehr. Es sind auch in diesem Wachstumsstadium keine Insektizide derzeit zugelassen. Jetzt muss der Raps den starken Druck den Rapserrdfloh also kompensieren. Tatsächlich ist das der erste Herbst seit Beginn meiner Aufzeichnungen in 2007 wo der Bekämpfungsrichtwert in der Gelbschale an fast allen Standorten nahezu erreicht wurde (**Tabelle 1**) ! Das wird in einer erheblichen Anzahl von Rapserrdflohlarven resultieren, für deren Bekämpfung AUCH KEIN Insektizid derzeit zugelassen ist.

Einzelne Standorte zeigen bereits den ersten, vereinzelt Zuflug des Schwarzen Kohltriebrüsslers (**Bild 1**). Dieser Schädling legt seine Eier in die Blattstiele ab, wobei die Ei-Ablagestellen durch den Wundkallus leicht zu erkennen sind (**Bild 2**). Seine Larven minieren erst in den Blattstielen, um sich dann zum Herz der Pflanze über den Winter durchzufressen (**Bild 3**). Der Schwarze Kohltriebrüssler lässt sich mit der Gelbschale nur schlecht erfassen, d.h. der Befall ist größer als man anhand der Gelbschale annehmen kann.



Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am **05. Oktober 2026**. Angegeben ist jeweils die mittlere Anzahl des Schädlings pro Gelbschale, bzw. der mittlere prozentuale Anteil der zerstörten Blattfläche, bzw. eine Einschätzung der Zuflugstärke der Kohlflye.

Region	Minette	Mosel	Gutland		Oesling	
Standort Sorte Saattermin	Oberkorn Eros # 26/08/2026	Burmerange Hemma # 23/08/26	Everlange LG Armada 25/08/2026	Bettendorf Ceos # 21/08/2026	Kehmen Daktari # 26/08/2026	Reuler Olivia /Amea 24/08/26
Rapserrdföhe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen (seit 28/09/2026)	15	48	39	49	45	19
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserrdfloh Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	4%	4-6%	<2%	6-8%	8%	<2%
Schwarzer Kohltriebrüssler Bekämpfungsrichtwert beträgt 10 Käfer pro Gelbschale in 3 Tagen	0	1	1	1	0	0
Zuflug Kohlflye Bekämpfungsrichtwert unbekannt	gering	gering	gering	gering	gering	sehr gering
Pflanzenkrankheiten	---	---	---	---	---	---
Stadium Raps (in BBCH*)	15-16	15-16	16	15-16	14	15

LEGENDE



Bestand bereits behandelt



Bestand behandeln



Bestand kontrollieren



Keine Behandlung notwendig

* **BBCH 14** = Viertes Laubblatt entfaltet; **BBCH 15** = Fünftes Laubblatt entfaltet; **BBCH 16** = Sechstes Laubblatt entfaltet. # = mit Beimischung einer frühblühenden Sorte (z.B. Exavance) als Fangpflanze zur Kontrolle des Rapsgranzkäfers.

Kurzfassung

- Bestände sind im Stadium BBCH 15 bis BBCH 16.
- Druck durch den Rapserrdfloh regional immer noch hoch.
- Wirkung der Pyrethroide vermutlich nur gering aufgrund der Resistenz.
- Bei Einsatz von Insektiziden die Anwendungsaufgaben betreffend BBCH Stadien prüfen.
- Erster vereinzelter Zuflug des Schwarzen Kohltriebrüsslers. Derzeit KEIN Handlungsbedarf.

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann

Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST)
Environmental Sensing and Modelling Unit (ENVISION)
Agro-environmental Systems Group
41, rue du Brill | L-4422 Belvaux | LUXEMBOURG
michael.eickermann@list.lu; 0049 173 377 58 18

