

Schädlinge im Raps

17. – 21. September 2026

Der fehlende Niederschlag macht Sorgen. Je nach Lage profitieren einige Schläge vom Tau, so dass hier eine Entwicklung sichtbar ist. Bei schlecht entwickelten Schlägen genügt das aber nicht. Die Pflanzendichten sind (je nach Saatechnik) insgesamt gut, aber es zeigen sich bereits Entwicklungsunterschiede von teilweise zwei Wuchsstadien im Feld. Im Schnitt ist der Raps im Vierblattstadium (BBCH 14).

Der starke Zuflug des Rapserrdflohs aus der Vorwoche hat sich NICHT fortgesetzt! Das ist gut! Offenbar ist das, was an Käfern den Sommer überlebt hat, nun zugewandert. Der Bekämpfungsrichtwert wurde nicht erreicht. Hier noch einmal die Bekämpfungsrichtwerte:

50 Rapserrdflohe pro Gelbschale innerhalb von 10 Tagen ODER 10% der Blattfläche durch Lochfraß des Rapserrdflohs zerstört!

Nach dem Vierblattstadium (BBCH 14) sind keine Insektizide mehr zur Kontrolle der adulten Rapserrdflohe vorgesehen, weil man davon ausgeht, dass die Blattfläche ausreicht, um die Jungpflanze zu versorgen. Bei der Kohlflye ist keine chemische Bekämpfung zugelassen. Die Schäden der Larven an der Pfahlwurzel werden in einem Herbst mit ausreichenden Niederschlägen i.A. kompensiert. Schnecke sollte immer noch kontrolliert werden, teilweise auch im Inneren des Schlages mal schauen. Es findet sich etwas Falscher Mehltau auf einigen Schlägen. Der ist aber nicht ertragsrelevant.

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am **21. September 2026**. Angegeben ist jeweils die mittlere Anzahl des Schädlings pro Gelbschale, bzw. der mittlere prozentuale Anteil der zerstörten Blattfläche, bzw. eine Einschätzung der Zuflugstärke der Kohlflye.

Region	Minette	Mosel	Gutland		Oesling	
Standort Sorte Saattermin	Oberkorn Eros # 26/08/2026	Burmerange Hemma # 23/08/26	Everlange LG Armada 25/08/2026	Bettendorf Ceos # 21/08/2026	Kehmen Daktari # 26/08/2026	Reuler Olivia /Amea 24/08/26
Rapserrdflohe pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen (seit 17/09/2026)	4	3	3	6	5	1
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserrdfloh Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	<2%	2%	2%	<2%	2%	<2%
Zuflug Kohlflye Bekämpfungsrichtwert unbekannt	mittel	gering	mittel	mittel	mittel	sehr gering
Pflanzenkrankheiten	Falscher Mehltau	---	---	---	---	Falscher Mehltau
Stadium Raps (in BBCH*)	14	14	14	14	13-14	14

LEGENDE



Bestand bereits behandelt



Bestand behandeln



Bestand kontrollieren



Keine Behandlung notwendig

* **BBCH 13** = Drittes Laubblatt entfaltet; **BBCH 14** = Viertes Laubblatt entfaltet. # = mit Beimischung einer frühblühenden Sorte (z.B. Exavance) als Fangpflanze zur Kontrolle des Rapsgranzkäfers.

Kurzfassung

- Bestände sind im Vier-Blatt-Stadium (BBCH 14)
- Druck durch den Rapserrdfloh wieder gering.
- Ab dem Stadium BBCH 14 ist keine Bekämpfung der adulten Käfer mehr notwendig, weil die Blattfläche normal entwickelter Pflanzen ausreicht.
- Eine Bekämpfung der Larven ist nicht zugelassen!
- An den Feldrändern auf Schnecken achten.
- Etwas Falscher Mehltau aufgrund der Witterung. Der ist kein Problem.



KONTAKT: Dr. Michael Eickermann

Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST)
Environmental Sensing and Modelling Unit (ENVISION)
Agro-environmental Systems Group
41, rue du Brill | L-4422 Belvaux | LUXEMBOURG
michael.eickermann@list.lu; 0049 173 377 58 18

Das Projekt „SENTINELLE“ wird finanziert mit Hilfe des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau.