

Schädlinge im Raps

02. – 09. Oktober 2025

Auffällig sind dieses Jahr viele Lücken beim Feldaufgang im Raps – ein Phänomen von der Mosel bis ins Ösling. Auch am Wurzelhalsdurchmesser für den Winter fehlt noch einiges. Der Zuflug des **Schwarzen Kohltriebrüsslers** ist bisher nur sehr verhalten zu Burmerange und Kehmen zu sehen. Aus dem Erdflodruck ist der Raps entwachsen. ABER: Die Ei-Ablage geht natürlich noch weiter bis in den ersten Frost. Das ist das Problem mit beiden Schadinsekten: sie sind Kühlbrüter, d.h. sie passen sich den abkühlenden Temperaturen langsam an und verlieren an Mobilität. Dafür intensivieren sie aber die Ei-Ablage. Vermutlich werden wir im Winter noch mal Pflanzenproben nehmen, um den Befallsdruck zu bestimmen. **Phoma** ist auf allen Schlägen zu finden, intensiviert sich aber durch die Sonneneinstrahlung etwas. Am stärksten ist Obercorn betroffen. Das Ösling zeigt nur wenige Pflanzen im Schlag mit Phoma-Symptomen. Achten Sie bitte noch auf Schnecken. Die Feldränder einiger Rapsschläge sind teilweise leergefressen. Das darf eigentlich nicht passieren.



Bild 1: Schwarzer Kohltriebrüssler
© Eickermann

Tabelle 1: Erfassung der Rapsschädlinge am **09. Oktober 2025**. Angegeben ist jeweils die mittlere Anzahl des Schädlings pro Gelbschale, bzw. der mittlere prozentuale Anteil der zerstörten Blattfläche, bzw. eine Einschätzung der Zuflugstärke der Kohlflye.

Region	Minette	Mosel	Gutland	Oesling	
Standort Sorte Saattermin	Obercorn Columbia 25/08/2025	Burmerange Ceos 22/08/2025	Everlange Churchill 25/08/2025	Kehmen Daktari # 25/08/2025	Reuler Astana 22/08/2025
Rapserröfle pro Gelbschale Bekämpfungsrichtwert beträgt 50 Käfer pro Gelbschale in 10 Tagen (seit 01. Oktober)	9	14	5	16	3
% zerstörte Blattfläche durch den Rapserröfle Bekämpfungsrichtwert: 10% pro Pflanze	<2%	6%	2-4%	4-6%	2%
Schwarze Kohltriebrüssler pro Gelbschale Bekämpfungsricht- wert beträgt 10 Käfer pro Gelbschale in 3 Tagen	0	3	0	1	0
Zuflug Kohlflye Bekämpfungsrichtwert unbekannt	sehr gering	sehr gering	sehr gering	sehr gering	sehr gering
Pflanzenkrankheiten	Phoma	Phoma	Phoma	Phoma	Phoma
Stadium Raps (in BBCH*)	16-17	16	16	16	14-15

= mit 10% Beimischung der Liniensorte Alicia als Fangpflanze zur Kontrolle des Rapsgrünkäfers

* **BBCH 14** = Viertes Laubblatt entfaltet; **BBCH 15** = fünftes Laubblatt entfaltet; **BBCH 16** = Sechstes Laubblatt entfaltet; **BBCH 17** = Siebentes Laubblatt entfaltet.



Bestand bereits behandelt



Bestand behandeln



Bestand kontrollieren



Keine Behandlung notwendig

Kurzfassung:

- Auf Schnecken achten!
- Zuflug Schwarzer Kohltriebrüssler sehr gering
- Phoma intensiviert sich etwas, aber noch auf niedrigem Niveau (am geringsten im Oesling, in Obercorn am stärksten)
- Grad des Phomabefalls bei der Einkürzung bei der Produktwahl berücksichtigen

KONTAKT: Dr. Michael Eickermann

Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST)
Environmental Sensing and Modelling (ENVISION)
Agro-Environmental Systems Group
41, rue du Brill | L-4422 Belvaux | LUXEMBOURG
michael.eickermann@list.lu; 0049 173 377 58 18